¿Que es Fibrilación Auricular (FA)?

La fibrilación auricular ó FA, ocurre cuando las cámaras superiores del corazón, o aurículas laten irregularmente y de manera descontrolada.[1]

Latido cardíaco normal

Flujo de señales eléctricas en un latido cardíaco normal.



Fibrilación Auricular

Fibrilación auricular con señales anormales que provienen de la aurícula.



1 de cada 4 adultos mayores de 40 tienen riesgo de padecer FA.

5X

La FA se asocia con un **riesgo 5 veces mayor** de embolia y insuficiencia cardíaca.

Los síntomas incluyen, fatiga, mareos, ansiedad, y disminución de la capacidad de ejercicio.

Tratamiento

Usualmente los medicamentos se ofrecen como primera opción para controlar la FA.

50%

Cerca del 50% de los pacientes con FA no responden o no toleran los medicamentos. [3]

Ablación con catéter

La ablación con catéter es un procedimiento mínimamente invasivo que bloquea impulsos eléctricos anormales y restablece el corazón a un ritmo normal.[1]

El procedimiento está recomendado por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón en pacientes cuando los medicamentos resultan ineficaces. [2]

Get smart about AFIB .com

Si los medicamentos no funcionan o producen efectos secundarios negativos, pregunte a su médico acerca de la ablación con catéter.

La ablación con catéter es un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo, que puede:

Mejorar la calidad de vida

Brindar alivio de los síntomas

Disminuye el riesgo de ictus

Los pacientes que reciben ablación con catéter han demostrado tener hasta un **73% más de probabilidad de no presentar síntomas** a los 4 años en comparación con pacientes que recibían terapia con fármacos.

Recupere su vida

Consulte a su médico si la ablación con catéter es la opción adecuada de tratamiento para usted.

1. Mayo Clinic. Cardiac Ablation https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cardiac-ablation/about/pac-20384993?p=1. Accessed December 6, 2022.
2. Hugh Calkins, Gerhard Hindricks, Ricardo Cappato, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ SOLAECE expert consensus statement on catheter ablation and surgical ablation of atrial fibrillation. Heart Rhythm 2017.
3. Calkins H, Reynolds R, Spector P et al. Treatment of Atrial Fibrillation with Antiarrhythmic Drugs or RF Ablation. Circ Arrhythm and Electrophysiol. 2009.

Como cualquier tratamiento médico, los resultados individuales pueden variar. Sólo un cardiólogo o electrofisiólogo puede determinar si la ablación es una opción adecuada de tratamiento. Existen riesgos potenciales, que incluyen sangrado, inflamación o hematoma en el sitio de inserción del catéter e infección. Las complicaciones más serias son raras, estas pueden incluir daño al corazón o a los vasos sanguíneos; coágulos sanguíneos (que puede ocasionar un ictus); ataque cardíaco o muerte. Estos riesgos deben discutirse con su médico y la recuperación requiere tiempo. El éxito de este procedimiento depende de distintos factores, que incluyen su condición física y la capacidad del cuerpo para tolerar el procedimiento. Sea cuidadoso con la selección de sus médicos y hospitales en base a su habilidad y experiencia.

El catéter THERMOCOOL SMARTTOUCH® SF está indicado para el tratamiento de fibrilación auricular (FA) paroxística sintomática recurrente refractaria a los fármacos y para FA persistente sintomática recurrente refractaria a fármacos (FA continua > 7 días, pero < 1 año), refractario o intolerante al menos a una Clase I or III de AAR, cuando se usa con el Sistema CARTO®.

Información importante: antes de utilizarlo, consulte las instrucciones suministradas con este dispositivo para indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, advertencias y precauciones.
Precaución: las leyes de los E.U.A prohíben que este dispositivo sea vendido por parte de un médico o por orden de éste.

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618
USA Tel: +1-909-839-8500 Tel: +1-800-729-9010
www.biosensewebster.com

©Biosense Webster, Inc. 2022 119107-220825

Get smart about AFIB® .com