Percorso di Screening FA

Conosci il ritmo FA*

*Fibrillazione Atriale

INIZIO

Il Paziente

Nessun sintomo
- controllo di routine per pulsazioni irregolari

Sintomi presenti:
- Affanno/dispnea
- Palpitazioni
- Dolore toracico
- ....

Parlarne col medico se il paziente presenta chiaramente:

- Battito oltre 150
- Affanno
- Dispnea
- Dolore toracico
- Insufficienza cardiaca acuta

Pulsazioni continuamente o frequentemente irregolari?

Usare strumenti di screening FA

Pulsazioni regolari

NO

SI

Pulsazioni Irregolari

Associate a questi sintomi?

- Affanno o dispnea
- Palpitazioni
- Sincope o capogiri
- Dolori al petto
- Ictus/Attacco ischemico transitorio (TIA)

Fare ECG entro 48 ore
Parlare col medico dei risultati.

SI

NO

Conferma Fibrillazione Atriale

L'ECG standard non ha rilevato una sospetta FA parossistica?

Segui il percorso Miglior di Cura

- Fai un ECG delle 24 ore in caso di episodi asintomatici o quando distano meno di 24 ore l'uno dall'altro.
- Fai un ECG dinamico quando gli episodi sintomatici distano più di 24 ore l'uno dall'altro

A → **Valutare rischio ictus**

B → **Controllo ulteriore dei sintomi**

C → **Controllo fattori & comorbilità**

Usa il test CHA2DS2-VASc per calcolare il rischio di ictus dei tuoi pazienti e farti un'idea delle giuste cure.

I sintomi associati alla FA o le sue cure influiscono sulla funzionalità del paziente (qualità della vita soggettiva)?
Usa il punteggio EHRA per valutarlo.

Usa la Checklist di Screening per fare al paziente le domande giuste.



Per ULTERIORI INFORMAZIONI relative alla Fibrillazione Atriale, visitare **CONOSCIILRITMO.IT**

Il contenuto di questo documento, pubblicato dalla Johnson & Johnson Medical Spa Italia, unica responsabile dei suoi contenuti, è destinato a professionisti sanitari attivi in Italia. Offerto da Biosense Webster.
©JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa 2019. Tutti i diritti riservati.