

Koronavírus tájékoztató PF-betegeknek



A COVID-19, más néven az új koronavírus a világszerte gyorsan terjedő fertőző betegség kórokozója.

Ki van kitéve leginkább a kockázatnak?




Korlátozottan áll rendelkezésre információ a kockázati tényezőkről, de a jelenlegi tudás és a klinikai tapasztalat alapján kijelenthető, hogy az **idősek** és a **súlyos, krónikus betegek** esetén nagyobb a kockázata a COVID-19 által okozott súlyos fertőzésnek¹.

Hat dolgot tehetünk, amivel segíthetünk megfékezni a koronavírus terjedését

A betegség megelőzésének legjobb módja, ha nem találkozunk a vírussal.



Maradjon otthon, kivéve, ha orvosi ellátásra van szüksége



Ha kimegy az utcára, **viseljen arcmaszkot,** és tartson **2 méteres távolságot** másoktól.



Mosson gyakran kezet szappannal és meleg vízzel, legalább **20 másodpercig.**



Ne érintse meg az arcát.



Fertőtlenítse naponta a gyakran megérintett felületeket.



Figyeljen a tünetekre.

Mit tegyen, ha rosszul érzi magát?

Gondolja át, milyen tünetei vannak, és, ha szükséges, forduljon orvoshoz.




Ha a koronavírus-fertőzés **enyhe** tüneteit észleli

Gyakori tünetek²:

- köhögés,
- láz,
- légszomj.

Maradjon otthon, és hívja fel a háziorvosát


 azonnal, és számoljon be neki a tünetekről. Kövesse a háziorvos utasításait, különítse el magát otthon a többiektől, és nem menjen ki az utcára.

Ha a koronavírus-fertőzés **súlyos** tüneteit észleli

Súlyos tünetek²:

- nehézlégzés,
- állandó mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés,
- zavartság vagy levertség,
- elkékülő ajkak vagy arc.

Hívja a 112-öt.

 Ne üljön kocsiba, hogy kórházba menjen. A sürgősségi betegellátást végző személyzet a protokoll szerint fertőtleníti az eszközöket a saját és a betegek egészségének védelme érdekében.

Ha a PF tüneteit érzi

- Ezeket a tüneteket Ön már tapasztalta és képes felismerni őket. Továbbra is folytassa megszokott kezelését, akár úgy, hogy gyógyszert szed, akár úgy, hogy kizárja a PF-et okozó tényezőt az életéből. Ha gyógyszerre vagy tanácsra van szüksége, forduljon orvosához.
- Ha úgy gondolja, hogy most először alakult ki Önnél pitvarfibrilláció (PF): Hívja fel az orvosát azonnal, és beszélje meg vele a tüneteket. Csak kifejezetten az orvosa tanácsára vagy kérésére menjen be a rendelőbe vagy a kórházba.
- Ha a PF súlyos tüneteit tapasztalja, hívja a 112-öt.



Ha a stroke tüneteit érzi

Hívja a 112-öt. Ha stroke (agyvérzés) tüneteit észleli, hívja a 112-öt, és kérjen azonnal ellátást. A stroke tünetei³:

- az arc, kar és láb hirtelen jelentkező érzéketlensége vagy gyengesége, különösen, ha csak az egyik oldalon jelentkezik,
- hirtelen jelentkező zavartság, a beszéd nehezítettsége, a beszéd megértésének nehézsége,
- hirtelen látásvesztés,
- hirtelen fellépő járási nehézség, szédülés, egyensúlyvesztés vagy a koordináció hiánya.

All links to external website links are being provided as a convenience and for informational purposes only, Johnson & Johnson Medical Devices bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content. Ez a kiadvány kizárólag a EMEA-térségben terjeszthető.

1. People Who Are at Higher Risk for Severe Illness. Center for Diseases Control and Prevention website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html>. Updated April 15, 2020. Accessed April 16, 2020.
2. What to Do If You Are Sick. Center for Diseases Control and Prevention website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html>. Updated April 13, 2020. Accessed April 16, 2020.
3. Stroke Symptoms. American Heart Association website. <https://www.stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms>. Accessed April 16, 2020.
Az itt szereplő tájékoztatás nem pótolja a szakorvosi véleményt, és nem alkalmazható diagnosztikai vagy kezelési céllal. Kérdéseivel forduljon szakorvoshoz.
© Johnson & Johnson Medical NV/SA 139311-200506 EMEA