

Felépülés az ablációs eljárás után

Betegtájékoztató:



**Minden a
PF-RŐL**



Felépülésem

Közvetlenül az ablációs eljárás után

Az eljárás típusától és a csöveknek („hüvelyek”) a lágyékból történő eltávolításának időpontjától függően néhány óráig ágyban kell maradnia. Az egészségügyi csapat figyelemmel kíséri állapotát, és kezeli a sebeit.

- Amikor a csöveket közvetlenül a katéterlaboratóriumban végzett eljárás befejezése után eltávolítják, egy kötést/nyomókötést helyeznek a lágyékára, és várhatóan 4-6 óráig ágyban kell maradnia.
- Amíg a csövek a lágyékában maradnak, vagy amíg nyomókötést alkalmaznak, a lábának mozdulatlanak kell maradnia, nem szabad behajlítani vagy felülnie.
- Közvetlenül a felépülése után, az orvos megvizsgálja a lágyékát, és az ajánlása szerint óvatosan felkelhet az ágyból.

A kórházból való távozás után

- A kötéssel kapcsolatos tanács: a kötést a kezelés utáni napon távolítsa el, tisztítsa meg a bőrét enyhén szappanos vízzel, majd óvatosan szárítsa meg.
- 3-4 napig (amíg a bőre begyógyul) nem szabad fürdenie vagy úsznia, de zuhanyozhat.
- Kímélje a lágyékát, és ne mozogjon túl sokat. Az első két hétben nem szabad testmozgást vagy megerőltető fizikai tevékenységet végeznie.
- Egy hétig nem szabad gépjárművet vezetnie.

Az eljárás után a következő, normálisnak tekinthető tüneteket tapasztalhatja:

- a lágyék megduzzadása, elkékülése
- a lágyék és/vagy a láb néhány napig fáj vagy érzékeny
- továbbra is égő érzést tapasztal a mellkasában
- az első két hónapban aritmia tüneteket tapasztal

Felépülésem

Kihez forduljak, ha rosszul érzem magam vagy tüneteim vannak?

Forduljon a szakorvoshoz vagy a nővérhez, ha a következőket tapasztalja:

- a lágyéktájékon előforduló duzzanat, fájdalom és/vagy vörösség
- légszomj vagy mellkasi fájdalom
- a szív mögött jelentkező fájdalom nyeléskor
- több mint 24 óráig fennálló aritmia tünetek

Visszatérhet az aritmia az abláció után?

A kezelés utáni első néhány hétben gyakrabban lehet az az érzése, hogy kihagy a szíve, vagy az, hogy szívritmuszavar lép fel. Az aritmia visszatérhet az abláció után, mivel az eljárás során előidézett heg kialakulása körülbelül két hónapot vesz igénybe. Az első két hónapban még mindig tapasztalhat néhány aritmiára utaló tünetet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az eljárás sikertelen volt.

Ugyanakkor egy ideig úgy érezheti, hogy a szíve a megszokottnál gyorsabban ver, és fáradtnak érezheti magát, mivel a szívének és a szervezetének időre van szüksége, amíg ehhez hozzászokik. A tünetek idővel maguktól enyhülhetnek.

Ebben az időszakban az orvosa valószínűleg azt tanácsolja, hogy folytassa az aritmia betegségére kapott kezelést. Az eljárás utáni első ambuláns viziten az orvosa megbeszéli Önnel a kezelését, és azt, hogy ha/mikor hagyhatja abba.

A vérrögök megelőzése

Az eljárás után a vérrög képződés kockázatának minimalizálása érdekében fontos, hogy az első három hónapban ne szakítsa meg a vérhígító kezelést, még átmenetileg sem. A nem sürgős orvosi vagy fogorvosi eljárásokat el kell halasztani, ha ehhez abba kell hagyni a vérhígító kezelést.

Az első ambuláns viziten az orvosa megbeszéli Önnel a kezelését, és azt, hogy ha/mikor hagyhatja abba.

Utánkövetés

Az ablációs eljárás után szakorvosi utánkövetésre kell jelentkeznie a járóbeteg rendelésen. A viziten megbeszéljük az ablációs eljárás és a jelenlegi kezelésének eredményeit.

Betegtájékoztató:

1. Mi a szívritmuszavar?
2. Mi a pitvarfibrilláció?
3. Felkészülés az első aritmiával kapcsolatos konzultációra
4. Mi az ablációs eljárás?
5. Kórházi bennfekvés az ablációs eljárás érdekében
6. Felépülés az ablációs eljárás után

A pitvarfibrillációval kapcsolatos további FORRÁSOK a következő oldalon állnak rendelkezésre a betegek számára:

MINDENAPFROL.HU



Mint minden kezelés esetében, az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Csak a szívgyógyász vagy az elektrofiziológus tudja megállapítani, hogy az abláció a megfelelő kezelés. A lehetséges kockázatok közé tartoznak a katéter bevezetésének helyén fellépő vérzés, duzzanat vagy véraláfutás, valamint a fertőzés. Súlyosabb szövődmények ritkábban fordulnak elő, és ezek közé tartoznak a szív vagy a vérerek károsodása, vérrögök kialakulása (amelyek sztrókhhoz vezethetnek), szívinfarktus vagy halál. Ezeket meg kell beszélnie a kezelőorvosával. A felépüléshez idő kell.

A dokumentumot a Johnson & Johnson NV teszi közzé.

A kiadvány nem terjeszthető az EMEA régión kívül.

©Johnson & Johnson Medical NV. 2020. Minden jog fenntartva. 091239-200304 EMEA

HU-2021-03-331